Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE)

Dirección de Posgrado

Maestría en Salud Pública, mención Atención Integral en Urgencias y Emergencias

Línea de Investigación:

Atención en emergencias y cuidados críticos

Artículo Científico

Prevalencia de las Complicaciones Obstétricas en Sala de Parto del Hospital Padre Alberto Buffoni – Quinindé

Previo a la Obtención del Título de Magister en Salud Pública, mención AtenciónIntegral en Urgencias y Emergencias

Autor:

HORACIO ANDRÉS CANTOS BRAVOMALO

Asesor:

MSC. PUPO SUÑOL ANGEL EDUARDO

Esmeraldas, 2023

ANEXO 1

Prevalencia de las Complicaciones Obstétricas en Sala de Parto del Hospital Padre Alberto Buffoni – Quinindé.

Autores: Cantos Bravomalo Horacio Andrés[1], Angel Eduardo Pupo Suñol[2]

[1]Programa de Posgrado: Maestría en Salud Pública, mención Atención Integral en Urgencias y Emergencias. Médico general, Hospital Padre Alberto Buffoni – Quinindé.

[2]Grupo/Línea de Investigación. Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Esmeraldas), Esmeraldas, Ecuador. Máster en urgencias médicas. Profesor auxiliar 2, Pontificia Universidad Católica de Ecuador Sede Esmeraldas. Ecuador. Departamento de enfermería.

Email: hacantosb@pucese.edu.ec

Resumen

Objetivo: Analizar la prevalencia de las complicaciones obstétricas inmediatas en sala de parto del Hospital Padre Alberto Buffoni, en el periodo comprendido desde el 1ro de enero del año 2019 al 31 de diciembre del año 2020. ***Materiales y métodos****:* Se realizó un estudio cuantitativo, de corte transversal y enfoque descriptivo, retrospectivo no experimental, con una muestra de 264 pacientes con complicaciones puerperales inmediatas, que fueron atendidas en sala de parto del Hospital Padre Alberto Buffoni durante los años 2019 y 2020, en Quinindé - Ecuador. ***Resultados:*** Las mujeres que presentaron más complicaciones fueron adolescentes de 15 a 19 años y mayores de 36 años, casadas y de zonas urbanas. El 10,6% de las pacientes requirieron algún tipo de instrumentación (ventosa, fórceps o espátulas) y el 30,7% requirió cesárea. El 58,7% de las mujeres tuvieron partos eutócicos. La complicación más frecuente evidenciada fue atonía uterina con el 23,8%, seguido de anemia con el 20,5%, retención de membranas (18,6%), hemorragias (17,0%), desgarros perineales (13,3%) y por último, pero muy importante, preeclampsia (6,8%). ***Conclusiones:*** Las complicaciones puerperales descritas en la literatura no solo son una guía para la atención y el manejo de estas, sino que afirman que a pesar del paso del tiempo la hemorragia puerperal sigue y seguirá siendo un eje fundamental para estudiar las complicaciones puerperales.

Palabras clave: obstetricia; trabajo de parto; hemorragia uterina; monitoreo fetal; puerperio.

Prevalence of Obstetric Complications in the Delivery Room of the Hospital Padre Alberto Buffoni - Quinindé.

Abstract

Objective: To analyze the prevalence of immediate obstetric complications in the delivery room of the Padre Alberto Buffoni Hospital, in the period from January 1, 2019, to December 31, 2020. **Materials and methods:** A quantitative study was carried out, cross-sectional and descriptive, retrospective, with a non-experimental approach, to a sample of 264 patients with immediate puerperal complications. **Results:** The women who presented more complications were adolescents from 15 to 19 years old and older than 36, married and from urban areas. 10.6% of the patients required some type of instrumentation (vacuum cup, forceps or spatulas) and 30.7% required cesarean section. 58.7% of the women had eutocic deliveries. The most frequent complication evidenced was uterine atony with 23.8%, followed by anemia (20.5%), membrane retention (18.6%), hemorrhages (17.0%), perineal tears (13.3%) and finally, preeclampsia (6.8%). **Conclusions:** The puerperal complications described in the literature are not only a guide for the care and management of these but also affirm that despite the passage of time, puerperal hemorrhage continues and will continue to be a fundamental axis to study puerperal complications.

Keywords: Obstetrics; labor; uterine bleeding; fetal monitoring; puerperium.

Autor de correspondencia: Cantos Bravomalo Horacio Andrés[1]

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7769-0009

Correos: hacantosb@pucese.edu.ec

ANEXO 2

1) **NOMBRE DE LA REVISTA:** Medicentro ELECTRÓNICA
Revista Científica VILLA CLARA

2) **ENLACE URL DE LA REVISTA:** Medicentro Electrónica (sld.cu)

3) **ISSN DE LA REVISTA:** ISSN 1029-3043
4) **MEDIO(S) DE INDEXACIÓN:**



5) **ENLACE (URL) DEL ARTÍCULO PUBLICADO:** N/A

6) **VOLUMEN, NÚMERO, PÁGINAS:** N/A

7) **FECHA DE ENVÍO:** 11-01-2023

8) **FECHA DE ACEPTACIÓN:** 11-01-2023

9) **FECHA DE PUBLICACIÓN:** N/A

ANEXO 3

(Evidencias de envío a medio científico)

1) Documento de aprobación del asesor para realizar el envío del artículo científico (formato similar al usado para las tesis donde se especifica el porcentaje de similitud).

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Seréis mis testigos
ESMERALDAS
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA

AVAL ACADÉMICO DEL DIRECTOR DE TFM
REVISIÓN, Previo calificación

Yo, **MGT. PUPO SUÑOL ANGEL EDUARDO,** certifico que el estudiante **CANTOS BRAVOMALO HORACIO ANDRÉS** de la COHORTE E078-03 de la Maestría en Salud Pública, mención Atención Integral en Urgencias y Emergencias ha finalizado satisfactoriamente el **TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA (TFM)** con la opción de titulación: **ARTÍCULO** y tema: **PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN SALA DE PARTO DEL HOSPITAL PADRE ALBERTO BUFFONI – QUININDÉ,** por tanto, se encuentra apto para su revisión previa calificación y posterior solicitar fecha para defensa.

En Esmeraldas, jueves, 05 de enero de 2023

ANGEL EDUARDO PUPO SUÑOL

Docente Asesor

PORCENTAJE DE SIMILITUD TURNITIN

TFM ARTÍCULO


ORIGINALITY REPORT


7%	7%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.fundacionkoinonia.com.ve Internet Source	4%
2	apirepositorio.unh.edu.pe Internet Source	3%

2) Captura de pantalla del correo enviado al editor de la revista o en su defecto captura de pantalla de la plataforma de la revista en la que se sube el artículo.





3) Captura de pantalla del correo recibido por la plataforma o editor de la revista.

