

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
SEDE ESMERALDAS**



**ESCUELA DE ENFERMERÍA**

**TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.**

**TEMA:**

**USO DEL CONDÓN EN LAS TRABAJADORAS SEXUALES DE LA  
CIUDAD DE ESMERALDAS**

**AUTORA:**

**ALTAFUYA ALCIVAR CARMEN ISABEL**

**ASESOR:**

**MTR. JOSÉ MATEOS GARCÍA**

**ESMERALDAS, 2016**

## **TRIBUNAL DE GRADUACIÓN**

El trabajo de tesis aprobado luego de haber dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el reglamento de Grado de la PUCESE previo a la obtención del título de LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Presidente Tribunal de Graduación

---

Lector (a) 1

---

Lector (a) 2

---

Directora de la Escuela de Enfermería

---

Director de Tesis

Esmeraldas, Abril del 2016

## **AUTORÍA**

Yo, Carmen Isabel Altafuya Alcívar declaro que la presente investigación enmarcada en el actual trabajo de tesis, es absolutamente original, auténtica y personal.

En virtud que el contenido de esta investigación es de exclusiva responsabilidad legal y académica de la autora y de la PUCESE.

---

**Carmen Isabel Altafuya Alcívar**

**CI: 0803550243**

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios por prestarme vida, salud, sabiduría, fortaleza al momento de pasar cada peldaño hasta llegar aquí.

Agradezco a toda mi familia, a mi madre que ha sido mi apoyo constante, mis hermanos por sus consejos y motivación, a mi esposo por ser incondicional y a mi pequeño hijo que tuve que dejar por muchas ocasiones por dos eternos meses para realizar prácticas él es mi motor y ganas de progresar.

Agradezco a mis docentes por haberme inculcado bases teóricas-científicas que me ayudaron a formar para ser una profesional de calidad, a la PUCESE por haberme acogido en sus aulas. De manera especial le agradezco a mi tutor de tesis por su paciencia y dedicación.

## **DEDICATORIA**

Dedico esta investigación a Dios porque me permitió pasar cada obstáculo sin su presencia en mi vida nada lograría.

A los amores de mi vida mi madre y mi hijo mis logros son sus logros los amo.

De manera especial le dedico esta investigación a mi padre que en vida me enseñó el valor de todo, aunque no esté entre nosotros, desde lo alto me ha cuidado y guiado, siéntete orgulloso lo ¡logre!

También dedico esta investigación a Cindy Ortiz, que se fue al cielo a curar las alas rotas de los ángeles y no pudo concluir su meta, en mi mente y en mi corazón eres eterna.

# ÍNDICE

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN .....	ii
AUTORÍA .....	iii
AGRADECIMIENTO .....	iv
DEDICATORIA .....	v
ÍNDICE .....	vi
ABREVIATURAS.....	vii
RESUMEN .....	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN .....	10
MATERIALES Y MÉTODOS .....	14
RESULTADOS .....	16
DISCUSIÓN .....	19
CONCLUSIONES .....	22
RECOMENDACIONES.....	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	24
ANEXOS.....	26

## **ABREVIATURAS**

**TS:** trabajadoras sexuales.

**RedTrabSex:** Red de trabajadoras sexuales.

**UNFPA:** Fondo de población de las Naciones Unidas.

**VIH:** Virus de inmunodeficiencia humana.

**SIDA:** Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

**ITS:** Infección de transmisión sexual.

**HSH:** Hombres que tienen sexo con hombres.

**MSP:** Ministerio de Salud Pública.

**ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

## **TÍTULO**

Uso del condón en las trabajadoras sexuales de la ciudad de Esmeraldas.

## **RESUMEN**

Las infecciones de transmisión sexual como el VIH/SIDA en el Ecuador y en la mayoría de los países de Latinoamérica se concentran en los grupos que tienen prácticas de riesgo, se han notificado prevalencias de VIH/SIDA en HSH en un 16% y en las TS 0.5% a 1%. Este trabajo tiene como objetivo valorar el uso del condón entre las trabajadoras sexuales que laboran dentro de los centros de tolerancia, ubicados en el casco urbano de la ciudad de Esmeraldas; para conocer y describir el conocimiento que tienen las trabajadoras sexuales sobre el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual y la frecuencia del uso del condón en su práctica diaria y con sus parejas estables en el caso que las tengan.

El tipo de investigación que se utilizó para elaborar este trabajo fue cuantitativo, aplicando una entrevista estructurada que contenía variables que se recogieron de un trabajo realizado en 8 ciudades del Ecuador. Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas, el 26% de ellas no tiene conocimientos sobre el VIH/SIDA, el 48% desconoce sobre ITS, 55% nunca utiliza condón con sus parejas mientras que el 100% lo usa siempre con sus clientes.

Queda evidenciado que los conocimientos de las TS en cuanto a ITS como el VIH/SIDA no son los adecuados, pese a esto el uso del condón con los usuarios es aceptado, no obstante con sus parejas regulares es prácticamente nulo.

### **Palabras claves**

Trabajadoras sexuales, uso del condón, VIH/SIDA, ITS.

## TOPIC

Condom use in sex workers in the city of Esmeraldas.

## ABSTRACT

Sexually transmitted infections as HIV/AIDS in Ecuador and in the majority of Latin American countries are concentrated in the groups which have risk practices, there have been notified prevalence in front of HIV/AIDS in MOMS (Men on men sex) in a 16 % and in the SW (sex workers) of 0,5 % to 1 %. This paper has as an objective, to value the use of condom among the sex workers work within the tolerance centers which are located in the center of Esmeraldas 'city, to know and describe the knowledge they have concerning HIV/AIDS and the sexually transmitted infections, and the frequency in the use of condom, in the dairy sexual practice with their stable couples in case they have one.

The type of investigation used to develop this paper was the quantitative one, applying a structured interview, which contained variables which were obtained in a paper developed in 8 cities of Ecuador. According to the obtained data in the surveys applied to the sex workers, the 26% of them do not know anything about HIV/AIDS, the 48% knows nothing about STI's, the 55% never use condom with their couples, while the 100% use them with their clients.

It is evident the knowledge of SW (sex workers), concerning STI's and HIV/AIDS is not the adequate one, even the use of condom is accepted with clients, although the use of them with their regular couple is practically null.

**Key words:** sexual workers, use of condom, HIV/AIDS, STI.

## INTRODUCCIÓN

Según ONUSIDA en el 2012 los casos por contagio de VIH disminuyeron siendo estos 2.3 millones por año, cifras anteriores de los años 90 se registraban en 3.5 millones por año. La reducción es notoria y esto se debe al esfuerzo en concienciación en cuanto al uso del condón, realización de pruebas diagnósticas, y someterse a las terapias de antirretrovirales en el caso de ser positivos (ONUSIDA, 2013).

Las infecciones de transmisión sexual como el VIH/SIDA en el Ecuador y en la mayoría de los países de Latinoamérica se concentran en los grupos que tienen prácticas de riesgo, se han notificado prevalencias de VIH/SIDA en HSH en un 16% y en las TS 0.5% a 1%, no se han notificado tasas elevadas de infección por VIH en las TS de la población latinoamericana pero si existen altos índices de el virus del herpes simple tipo 2 (Gutiérrez, 2006). Para lograr una óptima prevención y reducción de índices de ITS es importante entender la manera de operar de la población de TS frente a la negociación en el uso del preservativo en su ámbito laboral y con sus parejas estables. En los países africanos y asiáticos se ha logrado con éxito las intervenciones de prevención dirigidas a las TS puesto que se ha logrado elevar el uso del condón con los clientes, esto comprueba que si se puede realizar intervenciones con resultados satisfactorios para reducir las prácticas de riesgo, no obstante para los países latinoamericanos esto es todo un reto puesto que se ha logrado elevar un poco el uso del condón con los clientes pero no es persistente y con sus parejas estables es prácticamente nulo. El trabajo llevado a cabo por Gutiérrez (2006) con 2867 TS en ocho ciudades del Ecuador, muestra que el 58% tienen pareja regular, el 82% usa siempre el condón, un 88% usó condón con el último cliente, el 6% de TS uso condón con sus parejas regulares en su última relación sexual, lo que evidencia un problema de uso de condón con las parejas. Los resultados de esta investigación, que es la primera muestra grande de TS en el Ecuador, arrojan evidencia sobre la poca efectividad de las campañas de prevención de ITS/VIH-SIDA en el país (Gutiérrez, 2006).

El trabajo sexual es el intercambio de actos sexuales con otra u otras personas a cambio de dinero o bienes con fines de lucro (RAE, 2014), aunque esta actividad es realizada por personas de diversas identidades de género, esta investigación se llevó a cabo exclusivamente con mujeres cissexuales, ya que es el sector poblacional que más realiza esta actividad.

El trabajo sexual es un tema amplio y polémico desde el punto de vista que se aborde, es así como surgen debates por parte de regulacionistas y abolicionistas en cuanto a la legalización o abolición del trabajo sexual. Estas posiciones conllevan un lenguaje distinto según la postura, dichas mujeres son definidas como asistenta sexual, mujer de la calle, víctima de trata, escort, trabajadoras sexuales, el nombre que se les dé es importante puesto que con estos se abordan de diferente manera la realidad de las mujeres que intercambian sexo por dinero, teniendo en cuenta que son diferentes las razones y circunstancias que las llevan a realizar esta actividad. La ONG Amnistía internacional tras dos años de investigación recomienda la despenalización de la prostitución en el mundo, para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales (Amnistía Internacional, 2015). En este estudio se nombrará por trabajadora sexual como término oficializado por la RAE, sin querer con ello buscar una posición ante este debate.

La UNFPA realizó una investigación con el objetivo de conocer la dinámica del trabajo sexual en las fronteras nortes del Ecuador, en dicho trabajo también participaron entidades como la RedTrabSex-Ecuador, MSP, ACNUR, etc. Entre las provincias fronterizas norte tenemos la provincia de Esmeraldas, en esta provincia se trabajó con 331 TS, la investigación arrojó datos relevantes, un 72.5% son mujeres de 18 a 31 años, el 76,1% están solteras, viudas, separadas o divorciadas y tan solo el 23% tienen pareja estable. El 72.8% de ellas refiere haberse involucrado a este oficio por necesidades económicas, el 97% de TS son sostén de hogar, un 90.3% trabajan en un local, de las TS que fueron encuestadas un 36% conoce sobre el VIH/SIDA, y un 88.8% han escuchado de las ITS en general (UNFPA, 2009). El 99.4% de las TS afirman usar siempre el condón con clientes, aunque solo el 14.2% lo usan permanentemente con sus parejas

estables. Es por esta razón que estudios anteriores se concentran en el uso del condón con las parejas sexuales estables de las TS. De las TS participantes el 9.7% habían sido diagnosticadas con al menos una ITS, el 97.3% aseguran asistir a un chequeo regular. El 96.1% de TS de la provincia de Esmeraldas cuentan con la tarjeta integral de salud (UNFPA, 2009).

El MSP, realizó una Guía Nacional de Normas de Atención Integral a Trabajadoras Sexuales como Población Vulnerable. El propósito de esta normativa es promover en el país la atención estandarizada e integral en la salud sexual y reproductiva de las trabajadoras sexuales como población vulnerable, bajo el marco de la institucionalidad e intersectorialidad, a fin de interrumpir la transmisión de las ITS, VIH y SIDA (MSP, 2007).

Históricamente se ha relacionado las infecciones de transmisión sexual con el trabajo sexual, pese a esta vinculación se ha demostrado en trabajos realizados en países occidentales que la prevalencia de ITS como el VIH/SIDA son bajos en trabajadoras sexuales exceptuando las que usaban drogas vía parenteral y/o tenían parejas infectadas. El trabajo de Belza (2004) consistía en realizar análisis, examen físico y entrevistar a las TS en el momento de realizarse los chequeos médicos y los resultados arrojaron los siguientes datos: la muestra fue 579 mujeres inmigrantes, de ellas el 70.1% nunca usaba condón en sus relaciones vaginales con sus parejas y el 75% nunca uso condón en sus relaciones anales privadas en los últimos 30 días, el 98.6% uso condón en las relaciones vaginales con los usuarios en los últimos 30 días previos a la entrevista, de las TS que participaron en dicha investigación el 51.4% por primera vez se practicaban una prueba de VIH y de ellas solo 1 resultó positiva (Belza, 2004).

El trabajo sexual es una actividad que se practica en todos los países del mundo de manera legal e ilegal, las trabajadoras son en su mayoría del sexo femenino y tiene gran demanda por hombres heterosexuales, el trabajo sexual es estigmatizado y por esta razón no se les reconoce los derechos que merecen y necesitan las mujeres que ejercen este trabajo. El estudio cualitativo de Adalgiza (2005) con 15 TS concluyó lo siguiente:

las TS se encuentran entre los 21 y 43 años, cinco eran analfabetas, 5 con primaria incompleta, una con primaria completa, 3 con secundaria completa, 12 separadas, el promedio de hijos 3, antes de ingresar a este empleo ellas trabajan de manera informales y formales de bajo status (Adalgiza, 2005).

A nivel de Latinoamérica existe la Red de Trabajadoras Sexuales (RedTrabSex), en el 2005 en el Ecuador se creó la RedTrabSex-Ecuador y en la actualidad se encuentra presente en 15 provincias del país, siendo un logro para las TS porque han podido trabajar conjuntamente por sus derechos (RedTrabSex, 2012). La RedTrabSex-Ecuador abogó ante el gobierno nacional para que se incluyera su actividad en el código laboral, para que de esta manera puedan acceder a los derechos de un trabajador (El Diario, 2009). En el borrador del Código Laboral, que aún se encuentra en estudio, está planteado que las TS que se encuentren laborando en los centros de tolerancia deberán recibir beneficios por parte de los dueños de estos lugares, entre ellos está que las TS tendrán seguro social y un lugar seguro de trabajo (El Diario, 2014).

Pese a los avances en derechos y educación las trabajadoras sexuales se encuentran en un riesgo diario frente a las ITS como lo es la infección por VIH, y podrían ser un vehículo de las mismas. Por esto surgió el interés en realizar esta investigación, no se puede excluir a una trabajadora sexual, conociendo que ellas son una parte vulnerable en cuanto a salud pública, debemos hacer seguimientos exhaustivos, concienciando la importancia de sus chequeos regulares, el uso consistente del condón con sus parejas regulares y clientes. Este trabajo tiene como objetivo valorar el uso del condón entre las trabajadoras sexuales que laboran dentro de los centros de tolerancia, ubicados en el casco urbano de la ciudad de Esmeraldas; para conocer y describir el conocimiento que tienen las trabajadoras sexuales sobre el VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual y la frecuencia del uso del condón en su práctica diaria y con sus parejas estables en el caso que las tengan.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

La presente investigación se realizó en diez de los once centros de tolerancias que están ubicados dentro del casco urbano de la ciudad de Esmeraldas. La investigación se llevó a cabo desde noviembre del 2015 hasta febrero del 2016. Se solicitó la autorización del ingreso a los propietarios y/o administradores de los centros de tolerancia con días de anticipación de la recolección de datos a través de un documento.

Se utilizó el tipo de muestreo intencionada o teórica, porque la selección fue de manera directa a los sujetos de la población; a los que más fácil acceso se pudo obtener. La muestra que se escogió para la investigación se dirigió exclusivamente a las trabajadoras sexuales, que ejercen esta actividad en los centros de tolerancia ubicados en el casco urbano de la ciudad de Esmeraldas. El número total de la muestra fue de 92 TS.

El tipo de investigación que se utilizó para elaborar este trabajo fue cuantitativo debido a que se recogieron los datos de manera estadística logrando obtener la información y describirla en frecuencias y porcentajes.

El instrumento de recolección fue una entrevista estructurada, aplicada por la investigadora a las TS que aceptaron colaborar luego de haberles explicado el propósito de la investigación y asegurarles que estaba basado en total confidencialidad la entrevista recoge las siguientes variables: Sociodemográficas como la edad, hijos, estado civil, ingreso económico mensual, nivel de escolaridad, viven en la ciudad que trabajan, trabajo adicional, tiempo en el oficio; dentro de la Historia sexual la edad de inicio sexual; el Perfil Sanitario incluyo tarjeta de salud integral, control sanitario, discriminación, educación sexual, conocimiento sobre VIH/SIDA e ITS, ITS diagnosticada, uso del condón, uso del condón en su última relación sexual, uso del condón con pareja estable, sugerencia del uso del condón, y obtención de condones. Las


variables fueron extraídas de un estudio previo, sobre el uso inconsistente del condón entre las TS del Ecuador (Gutiérrez, 2006).

El método de análisis que se utilizó fue la tabulación de datos a través del programa Excel 2013, con este se realizó la elaboración de gráficos y cuadros que llevaron barras, frecuencia y porcentajes de la información obtenida a través de la entrevista estructurada.


## RESULTADOS

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas que se le realizaron a las TS que se encontraban en ese momento en los centros de tolerancia ubicados en el casco urbano de la ciudad de Esmeraldas, el 48% de las participantes se encontraban entre los 18 a 24 años de edad, el 69% de TS eran solteras, viudas o separadas. El 86% de TS afirmaron tener hijos. Se logró evidenciar que el 52% de las participantes cursó por la secundaria, de las TS el 97% tienen la tarjeta integral de salud actualizada y el 93% de ellas realizan chequeos médicos mensuales.


Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas, el 26% de ellas no tiene conocimientos sobre el VIH/SIDA (FIGURA #1), es importante conocer este valor estadístico pues se supone que mantener informada a las TS de ITS como esta es una labor del equipo de salud. Solicitamos conceptos sobre VIH-SIDA para constatar el conocimiento es así como tenemos que de las 68 (74%) TS que afirmaron conocer sobre el tema, 20 mencionaron que uno es el virus y el otro la enfermedad, 19 que es una enfermedad mortal, 19 que es una enfermedad venérea, y por último 10 refirieron que esta es una enfermedad que es causada por no usar condón.



En los datos obtenidos de las encuestas que se les realizó a las 92 TS, en cuanto a los conocimientos de las ITS el 48%, que se acerca a la mitad de la muestra de trabajadoras sexuales, desconocía totalmente del tema (FIGURA #2). En el momento de realizar la entrevista se les pidió que mencionaran una ITS para comprobar el conocimiento es así como obtuvimos que de las 48 mujeres que afirmaron conocer del tema 3 nombraron chancro como ejemplo, 23 gonorrea, 3 herpes, 12 sífilis y 7 mencionaron Virus del Papiloma humano (VPH).



En las encuestas realizadas a las TS se evidenció que el 55% de ellas nunca utiliza condón con sus parejas estables (FIGURA #3). De acuerdo a los datos en cuanto al uso del condón en las TS con sus clientes, el 100% afirma usarlo siempre, el 92% de participantes sugieren el uso del condón. El 87% de TS obtienen sus condones a través del MSP y las farmacias.



## DISCUSIÓN

El uso del condón en toda relación sexual es importante, no solo si hablamos de un embarazo no deseado, también existe el riesgo de contraer alguna ITS como el VIH, VPH, etc. Es importante recalcar el uso del preservativo y más en las trabajadoras sexuales, porque es una población que se encuentra en alto riesgo por la actividad diaria que realizan, no conocen el proceder y antecedentes sanitarios de sus usuarios/clientes ni de sus parejas.

De los datos arrojados en la investigación es notorio que las variables se relacionan entre sí e influyen en el uso del condón de las TS, así se pudo evidenciar que las trabajadoras sexuales no cuentan con los conocimientos necesarios frente al VIH/SIDA e ITS generales resaltando que es necesario conocer patologías con su sintomatología, tratamientos y todo en cuanto a estos temas, bien se recalca que este es labor del sector de salud pública, negativamente hay que señalar que la falta de interés de aprender o el complejo entendimiento se mezcla con la colaboración del equipo de salud en cuanto a la educación y discriminación hacia las TS.

Por otra parte el uso del condón es aceptado totalmente con los usuarios o clientes, no obstante si hablamos de sus relaciones sexuales con sus parejas estables (novios, maridos) es prácticamente nulo y esto se debe al factor confianza que existe de parte de ellas, vale recalcar que si las TS mantienen un cuidado máximo al momento de su trabajo esto se expone en total riesgo en el momento de mantener relaciones con sus parejas regulares que podrían tener otras parejas y ellos llegarían a ser vehículos de ITS.

Para poder ejercer el trabajo sexual de manera regulada, estas mujeres (TS) deben ser mayores de edad y así registrarse para obtener el documento que les permitirá certificar su estado de salud óptimo y gozar de los chequeos y análisis regulares que llevan a cabo

mes a mes, donde el MSP les proporciona cierta cantidad de preservativos que bien hay que resaltar no les abastece y por consiguiente también los obtienen de las farmacias. Es importante mencionar que la presente investigación se realizó con una muestra pequeña y limitada de participantes en comparación con los estudios anteriores que se han realizado en cuanto al tema establecido. Las mujeres que participaron en este estudio el 48% se encuentran entre los 18 a 24 años de edad. Haciendo una comparación a los antecedentes de la investigación de la UNFPA el 72.5% son mujeres de 18 a 31 años, esto significa que mientras más joven sea la TS su demanda aumenta. De las 92 TS entrevistadas el 69% eran solteras, viudas o separadas, en el estudio de la UNFPA pese a que su muestra es mayor tiene una similitud en este dato con un 76.1%, vale recalcar que el 86% de las mujeres encuestadas refirieron tener hijos y por ende son cabeza de hogar y tienen toda la carga económica. Nuestra investigación evidencia que de las participantes el 52% cursó por la secundaria mientras que en la mencionada investigación comparativa el 41.7%, dentro de este trabajo son muchas las causas que permiten que las mujeres lo escojan. La falta de una profesión o de oportunidades laborales no permite conseguir un trabajo bien remunerado que supla con las necesidades de ellas y sus familias, y en vista de que este trabajo es de fácil acceso y buena remuneración se ven abocadas a este trabajo. Es importante conocer que el 26% de las 92 TS que participaron en la investigación no conozcan sobre el VIH-SIDA, siendo una práctica de riesgo el labor que ellas realizan a diario deberían estar empapadas del tema. En una muestra de 331 TS que fue la que recolectó el estudio de la UNFPA en la provincia de Esmeraldas solo el 36% de ellas conocen sobre el tema. El 88.8% de las participante del estudio en comparación si ha escuchado hablar de ITS en general mientras que nuestro estudio arroja un 52%.

Según los datos de la UNFPA el 96.1% cuenta con la tarjeta de salud integral, mientras que en nuestros datos el 97% cuenta con la tarjeta de salud integral actualizada, este es un requisito indispensable para que se les permita laborar en los centros de tolerancia. Según la UNFPA el 84.9% obtienen los condones en las farmacias, según nuestros datos el 87% de TS obtiene sus condones a través del MSP y farmacias. El 97.3% de participantes del estudio comparativo realizan chequeos periódicos por otra parte el

93% de nuestra muestra lo realiza mes a mes, sin este examen no actualizan la tarjeta integral de salud. En los datos de la UNFPA el 98.2% de TS se anticipan al uso del condón y en nuestra investigación es el 92%.

En nuestros antecedentes contamos con dos estudios realizados en el Ecuador donde resaltan el uso del condón de las trabajadoras sexuales en su área laboral, según el estudio realizado en 8 ciudades del Ecuador con la muestra de 2867 TS evidencia que el 82% de ellas usa siempre el condón, en cuanto a la UNFPA el 99.4% de las participantes utilizan siempre el condón y nuestros datos arrojan que el 100% de las TS entrevistadas usan el condón con sus clientes, en cuanto al uso del condón con las parejas regulares en el estudio de gran muestra solo el 6% uso condón, mientras que la UNFPA añade que el 50.9% de colaboradoras no uso preservativo en su última relación con sus parejas regulares, nuestra investigación evidencia que el 55% de TS nunca usa condón con sus parejas estables, es importante recalcar estos datos y realizar esta comparación porque se ha realizado en diferentes ámbitos con diferentes tamaños muestrales siendo evidenciada la analogía entre estas, no obstante resalta que en cuanto al uso del condón en el área de trabajo las trabajadoras sexuales están más concienciadas. Por otra parte tenemos los resultados del uso del condón con las parejas estables y esto evidencia una vez más que existe la posibilidad de que ellas contraigan alguna ITS por parte de sus parejas regulares en lugar de un usuario, se debe enfatizar en la importancia y el uso correcto del condón en las TS mostrándoles que los riesgos son iguales o mayores en su vida íntima a las de la parte laboral.

## CONCLUSIONES

- Se logra evidenciar que el conocimiento que tienen las trabajadoras sexuales que laboran en los centros de tolerancia no son suficientes en cuanto al VIH/SIDA e ITS de manera generalizada teniendo en cuenta que por el tipo de trabajo que realizan diariamente están expuestas a contraer diferentes enfermedades y ser vehículo de las mismas.
- Para las TS el uso del condón en sus relaciones sexuales con sus clientes/usuarios es permanente, aunque exista un grado de ignorancia en cuanto a los conceptos y conocimientos de las ITS, ellas están conscientes que el uso del condón es importante y sin él no existe trato.
- Se logró evidenciar que el uso del condón con sus parejas estables no tiene el mismo valor para ellas como lo es con sus clientes, el trabajo sexual es una actividad de cambios constantes, la mayor parte de las mujeres que realizan esta actividad rotan a nivel nacional e internacional, siendo el caso hipotético que sus parejas estables tengan así mismo otras parejas ellos podrían ser vehículo de ITS por esta razón deberían usar condón con ellos.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda al equipo de salud el aumento de educación de VIH/SIDA e ITS a las trabajadoras sexuales, y que el lenguaje que se emplee para esto sea el adecuado para lograr llegar de manera positiva hasta ellas.
- Se recomienda que se debería hacer seminarios o talleres dedicados exclusivamente a la educación de las trabajadoras sexuales, finalizando este con una retroalimentación y evaluación a las mismas para de esta manera saber si ellas han recibido el mensaje de la manera deseada.
- Debido al pequeño tamaño muestral, este estudio no es suficiente para extraer correlaciones analíticas, por lo que se considera adecuado seguir realizando estudios sobre esta temática.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adalgiza Amaya, G. E. (septiembre de 2005). Estigmatización de las trabajadoras sexuales en la salud. *Colombia Medica*, 65-74. Obtenido de <http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/378/382>
- El Diario. (14 de octubre de 2009). *eldiario.ec*. Obtenido de <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/134328-trabajadoras-sexuales-de-ecuador-piden-al-gobierno-el-reconocimiento-laboral/>
- Gutierrez JP, M.-Y. D. (2006). *Uso inconsistente del condón entre trabajadoras sexuales en Ecuador: resultados de una encuesta de comportamientos*. Mexico : Salud Publica .
- Internacional, A. (11 de agosto de 2015). *Amnistia Internacional*. Recuperado el 2 de octubre de 2015, de Amnistia Internacioanl: <https://www.amnesty.org/es/policy-on-state-obligations-to-respect-protect-and-fulfil-the-human-rights-of-sex-workers/>
- Maria Jose Belza, P. C. (2004). Condiciones sociolaborales. conductas de riesgo y prevalencia de infecciones de transmisión sexual en mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en Madrid. *Gac Sanit*, 177-183.
- MSP. (2007). *Guía Nacional de Normas de Atención Integral a Trabajadoras Sexuales como Población Vulnerable*. Quito: Nacional.
- ONUSIDA. (2013). *ONUSIDA*. Obtenido de ONUSIDA: [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/JC2571\\_AIDS\\_by\\_the\\_numbers\\_es\\_1.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2571_AIDS_by_the_numbers_es_1.pdf)

El Diario. (4 de mayo de 2014). *eldiario.ec*. Obtenido de eldiario.ec:  
<http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/314699-reconocen-el-trabajo-sexual/>

RAE. (octubre de 2014). *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 24 de agosto de 2014, de Diccionario de la lengua española:  
<http://lema.rae.es/drae/?val=>

RedTrabSex-Ecuador. (23 abril 2012). *redtrabsexecuador.com*. Obtenido de redtrabsexecuador.com: <http://redtrabsexecuador.com/index.php/features/our-history>

UNFPA. (2009). *Dinámica del trabajo sexual en la provincia de Esmeraldas-Ecuador*. Esmeraldas-Ecuador.

# ANEXOS

## ANEXO 1

### OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA UBICADOS DENTRO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
<b>PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO;</b>	Estudio estadístico de las características sociales de una población determinada.	<b>Edad</b>	< 18 años	<b>Encuesta</b>
			18 a 24 años	
			25 a 30 años	
			31 a 35	
			>36 años	
		<b>Hijos</b>	Si, ¿Cuántos?	<b>Encuesta</b>
			No	
		<b>Estado civil</b>	Soltera	<b>Encuesta</b>
			Casada	
			Divorciada	
			Unión libre	
			Viuda	
		<b>Ingreso económico mensual</b>	< 300 \$	<b>Encuesta</b>
			300 a 500 \$	
			500 a 1000 \$	
			>1000 \$	

		<b>Nivel de escolaridad</b>	Primaria	<b>Encuesta</b>
			Secundaria	
			Superior	
			Ninguna	
		<b>Viven en la ciudad que trabaja</b>	Si	<b>Encuesta</b>
			No ¿Porque?	
		<b>Trabajo adicional</b>	Si, ¿Cuál?	<b>Encuesta</b>
			No	
		<b>Tiempo en el oficio</b>	<1 año	<b>Encuesta</b>
			1 a 2 años	
			2 a 3 años	
			>3 años	

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE HISTORIA SEXUAL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA UBICADOS DENTRO DEL CASCO URBANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

VARIABLES	CONCEPTOS	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
<b>HISTORIA SEXUAL</b>	Precedentes de la vida sexual de una persona	<b>Edad de inicio sexual</b>	<15 años	<b>Encuesta</b>
			15 años	
			16 años	
			17 años	
			>17 años	

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL SANITARIO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA UBICADOS DENTRO DEL CASCO URBANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

VARIABLES	CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	TÉCNICAS
<b>PERFIL SANITARIO DE LA TRABAJADORA SEXUAL</b>	Antecedentes y conocimientos, en cuanto a los aspectos de salud de una persona.	<b>Tarjeta de salud integral</b>	Tiene actualizada	<b>Encuesta</b>
			Tiene caducada	
			No tiene	
			Nunca ha tenido	
		<b>Control sanitario</b>	Cada semana	<b>Encuesta</b>
			Cada 2 semanas	
			Mensuales	
			trimestrales	
		<b>Discriminación</b>	Siempre	<b>Encuesta</b>
			Nunca	
			A veces	
		<b>Educación sexual</b>	Siempre	<b>Encuesta</b>
			Nunca	
			A veces	
		<b>Conocimiento sobre VIH/SIDA</b>	Si ¿Qué es?	<b>Encuesta</b>
			No	
<b>Conocimiento sobre ITS</b>	Si, ¿Cuáles?	<b>Encuesta</b>		
	No			
<b>ITS diagnosticada</b>	Si, ¿cuál?	<b>Encuesta</b>		
	No			
<b>Uso del</b>	Siempre lo usa			
	Si el cliente no			

		<b>condón</b>	quiere no usa	<b>Encuesta</b>
			Si el cliente paga mas no usa	
		<b>Uso de condón en ultima relación sexual</b>	si	<b>Encuesta</b>
			No	
		<b>Uso de condón con pareja estable</b>	Siempre	<b>Encuesta</b>
			Nunca	
			A veces	
		<b>Sugerencia del uso del condón</b>	Yo	<b>Encuesta</b>
			Mi pareja/cliente	
			Juntos	
		<b>Obtención de condones</b>	MSP	<b>Encuesta</b>
			Farmacias	
			Lugar de trabajo	
			Fundaciones/asociaciones	
			Todas	

## ANEXO 2

### ENCUESTA DIRIGIDA A LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS DE TOLERANCIA UBICADOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

**Propósito:** Conocer el perfil sociodemográfico, perfil sanitario, e historia sexual de las trabajadoras sexuales de los centros de tolerancia de la ciudad de Esmeraldas, correspondientes a la investigación que titula: Uso del condón en las Trabajadoras Sexuales de la ciudad de Esmeraldas. Por lo cual solicitamos sinceridad y colaboración de las mismas.

1. ¿Cuántos años tiene?
  - <18 años ( )
  - 18 a 24 años ( )
  - 25 a 30 años ( )
  - 31 a 35 años ( )
  - >35 años ( )
2. ¿Qué estado civil tiene?
  - Casada ( )
  - Soltera ( )
  - Unión libre ( )
  - Divorciada ( )
  - Viuda ( )
3. ¿Tiene hijos?
  - Sí ( )            ¿Cuántos? .....
  - No ( )
4. ¿Cuál es su nivel de educación?
  - Primaria ( )
  - Secundaria ( )
  - Superior ( )

Ninguna ( )

5. ¿Vive y trabaja en Esmeraldas?

Si ( )

No ( ) ¿Porque? .....

6. ¿Realiza un trabajo adicional a este?

Si ( ) ¿Cuál? .....

No ( )

7. ¿Qué tiempo tiene en el oficio?

<1 años ( )

1 a 2 años ( )

2 a 3 años ( )

>3 años ( )

8. ¿Cuál es su ingreso económico mensual?

<300 \$ ( )

300 a 500 \$ ( )

500 a 1000 \$ ( )

>1000 ( )

9. ¿A qué edad inicio su vida sexual?

<15 años ( )

15 años ( )

16 años ( )

17 años ( )

>17 años ( )

10. ¿Tiene la tarjeta de Salud Integral?

Tiene actualizada ( )

Tiene caducada ( )

No tiene ( )

Nunca ha tenido ( )

11. ¿Cada que tiempo realiza sus controles médicos?

Cada semana ( )

Cada 2 semanas ( )

- Mensual ( )
- Trimestral ( )

- 12. ¿Recibe discriminación por parte del equipo de salud que la atiende?
  - Siempre ( )
  - Nunca ( )
  - A veces ( )
- 13. ¿Recibe educación sexual por parte del equipo de salud que la atiende?
  - Siempre ( )
  - Nunca ( )
  - A veces ( )
- 14. ¿Tiene conocimientos sobre el VIH/SIDA?
  - Si ( )
  - No ( )
  - ¿Qué es? .....
- 15. ¿Sabe que son las ITS?
  - Si ( )
  - No ( )
  - Mencione alguna: .....
- 16. ¿Tiene alguna ITS diagnosticada?
  - Si ( ), ¿Cuál? .....
  - No ( )
- 17. ¿Cuándo usa el condón?
  - Siempre ( )
  - Si el cliente no quiere no usa ( )
  - Si el cliente paga mas no usa ( )
- 18. ¿Uso condón en su última relación sexual?
  - Si ( )
  - No ( )
- 19. ¿Usa condón con su pareja estable, en el caso de tenerla?
  - Siempre ( )

Nunca ( )

A veces ( )

20. ¿Quién sugiere el uso del condón?

Yo/TS ( )

Mi pareja/ cliente ( )

Juntos ( )

21. ¿Cómo obtiene los condones?

MSP ( )

Farmacias ( )

Lugar de trabajo ( )

Fundaciones/asociaciones ( )

Todas ( )